

## Cefalgin. Lek przeciwbólowy.



### Nazwa

Cefalgin, 250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki. Lek przeciwbólowy.

### Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej

Paracetamolum, Propyphenazonum, Coffeinum.

### Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej

1 tabletkę zawiera 250 mg paracetamolu (*Paracetamolum*), 150 mg propyfenazonu (*Propyphenazonum*) i 50 mg kofeiny (*Coffeinum*).

### Postać farmaceutyczna

Tabletka.

### Wskazania do stosowania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle, gorączka.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek składnik produktu, nadwrażliwość na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol), ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek, zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, ostra porfria wątrobowa, choroba alkoholowa.

## **Opakowanie**

10 tabletek.

## **Podmiot odpowiedzialny**

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice.

